

**5 Dias Previo Al Examen:**

- Discontinuar Iron Supplements

**24 Horas Previo Al Examen:**

- NO Carafate O Antiacidos 24 Horas antes del examen
- NO Fumar 24 Horas antes del examen

**El Dia Anterior Al Examen:**

1. Tome solamente liquidos claros todo el dia. Liquidos claros permitidos: Agua, jugos defruta claros, sodas claras, caldo de gallina, gelatina sin sabor, helado de agua (popcicles). Puede tomar café o te sin leche. No puede tomar alimentos solidos, leche o productos derivados de la leche. No tome liquidos de color rojo, violeta, verde.
2. Tome (2) tabletas Dulcolax a las 12:00pm con liquidos claros
3. Tome one (1) bottle of Magnesium Citrate 10 oz. at 4:00pm.

**El Dia Del Examen:**

1. Tome su medicina critica ejemplo (para el la presion, el corazon, o ataques pelecticos, etc.) Dos horas antes de dijerir la capsula o dos horas despues de que se haya tragado la capsula.
2. Pacientes Diabeticos- Tome la ½ (mitad) de su dosis habitual.
3. Porfavor pongase ropa comoda de dos piasas y ropa de interior igual de dos piasas. No se ponga cremas, polvo, o aplique nada en el area abdominal el dia del examen. Durante el examen le pondran censores pequenos en el area abdominal. Usted se tendra que trajar la capsula y le pondran un cinturon que tiene la grabadora que graba las imagenes del sensor. Este cinto se lo tendra que poner el dia entero.
4. Cuando tenga este cinto puesto no puede entrar en ningun aeropuerto, no podra nadar o mojar el cinto y no se podra acercar a nadie que tenga un equipo similar.
5. Usted tendra que volver a la oficina en el tiempo dado para que le quiten el sensor y grabadora. Porfavor no se lo quite usted mismo.
6. Podra tomar algo de beber dos horas despues de que se haya tragado la capsula y podra comer un almuerzo lijero (como un sandwich) cuatro horas despues de que se haya tragado la capsula.

**Su Procedimiento Esta Fijado Para:**

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Hora:** \_\_\_\_\_ **Presentarse a las:** \_\_\_\_\_

**Lugar:4790 Barkley Circle Bldg. A Ft Myers Florida 33907**

**Su Visita Post Procedimiento es:**

**Fecha :** \_\_\_\_\_ **Hora:** \_\_\_\_\_ **am/pm En La**

**Oficina de FT MYERS.** Si tiene alguna pregunta en cuanto al procedimiento llamenos a nuestra oficina al (239) 275-8882 x507

# Endoscopia Capsular

## Informacion

- Una Capsula digerible equipada con una video camera que visualizar el intestino delgado.
- Un procedimiento alternativo para diagnosticar y evaluar desorden del intestino incluyendo sospechas de crohn's, celiaca, sangramiento sin explicacion, cancer intestinal, y nsaid ulceras relacionadas, etc.
- El unico equipo disponible para visualizar los 21 pies del intestino delgado, previamente visualizado solamente con cirugias
- Los resultados de este equipo son mejor que diagnosticos tradicionales y metodos de detectacion.

## Como Trabaja

- El sensor que esta en la capsula graba 2 imagenes por Segundo por ocho horas con la grabadora usado por el paciente. Esto da un resultado de aproximadamente 50, 000 imagenes del intestino delgado.
- La informacion de data transferida a la grabadora rapida estacional en el cinto usado paraver, editar, y archivar imagenes de video clip.

## Procedimiento

- El paciente debe dejar de comer y beber por 10 horas antes del examen.
- El sensor de endoscopia capsular empieza cuando el paciente injiere la capsula plastica (es del tamaño de una vitamina grande) con un baso de agua.
- Imagenes y data van hacer adquiridas por el sensor mientras que pasa por el sistema digestivo.
- Esta informacion va transmitida del sensor a la grabadora que esta colocada en el cinto que llevara el paciente en la cintura.
- El procedimiento total es de aproximadamente 8 horas.
- Los movimientos naturales del sistema digestivo hace que la capsula pase sin problema por el tubo intestinal y pasa sin dolor por el cuerpo usualmente en 24 horas.

## Despues del Procedimiento

- La capsula pasa naturalmente por un movimiento fecal tipico en 24 horas. Es posible que usted no se de cuenta.
- Le pedimos que porfavor vijile los movimientos fecales. Usted no necesita recojer la capsula, La capsula es bien facil de fleoshar por el inodoro. Ocasionalmente puede que usted vea dos lucesitas encenderse y apagarse.
- En ausencia de sintomas, y si usted no vio la capsula pasar, se puede hacer una radiografia despues de 14 dias par confirmar que ya haya pasado.
- Porfavor llamenos: llame a nuestra oficina y deje un mensaje en la contestadora si usted ve la capsula pasar.

## Aceptacion

- La FDA aprovo la capsula en Agosto del 2001; arjente marcado remobido Julio del 2003.
- Recibio la marca CE en Mayo 2001
- ASGE tecnologia comprobo la Endoscopia Capsular
- Sobre 500,000 Capsulas injerida en el mundo entero
- AMA asignado CPT 91110 para rembolsar la Capsula Endoscopica efectivo Enero 1, 2004.

## Riesgos

- Obstruccion intestinal puede pasar y se requiere cirujia inmediata.
- Retencion de la capsula es menos de 1%, y hasta 4% de retencion de la capsula es sospechado en la enfermedad crohn's.
- Puede ser que el examen se tenga que repetir por la perdida de imagenes. La perdida de imagenes ocurre con variaciones en el paciente de motilidad intestinal o interferencia con el equipo de grabaciones.
- Mantenerse alejado de maquinas radioactivas durante este procedimiento hasta que la capsula pase. Por la razon que capsula contiene metal.