

COLONOSCOPIA

Informacion sobre cosas que debes saber.....

QUE ES UNA COLONOSCOPIA?

La colonoscopia es un examen de el intestino grueso usando un tubo largo y flexible llamado colonoscopico. Este examen es echo por varias razones comunes. Normalmente investiga los encuentros de sangre fecal, diarrea, dolor abdominal, cambios fecales y una radiografia abnormal de enema.

QUE PASA DURENTE EL EXAMEN?

Un suero intravenoso empezara en su brazo. Dandole suficiente medicina para mantenerlo sedado y relajado. El examen es hecho cuando usted se acuesta del lado izquierdo. El doctor examina su area rectal con el dedo y despues pasa con cuidado y suavemente el colonoscopico por el colon y despues lo remueve suavemente con cuidado.

Si alguna abnormalidad es vista se le removera para biopsia. Crecimientos pequenos (llamado polipos) si son encontrados los removeran con cuidado. Pueden haber sangrados pequenos que se pueden parar quemando el area. Esto es un procedimiento bien facil, y en muchos casos elimira las necesidad de cirugia.

Su estadia en el centro cirurgico sera de aproximadamente dos horas, dependiendo de la cantidad de tiempo que se tome pasar el instrumento alrededor del colon. Cuando la medicina es dada, el procedimiento es usualmente es facil y el paciente no se recuerda haber tenido nada echo.

DESPUES DEL PROCEDIMIENTO:

Lo obserbaremos por treinta minutos antes de que se marche para su casa. No lo dejaran manejar, va a estar embriagado por varias horas despues de la coloscopia. El doctor hablara con usted y su familia y le dara un reporte de lo que encontro.

Una cita despues del examen sera echa para darle los resultados de la biopsia. La cita despues del examen es aparte y si su seguro requiere un copago sera colectado en esa visita.

RIESGOS:

Este examen es bien facil y seguro, pero puede haber una pequena posibilidad de riesgo a complicaciones de 1% al paciente.

Reaccion al medicamento puede ocurrir. Esto puede causar reaccion alergicas o problemas respiratorios. Sangramientos son posible. Perforaciones pueden pasar. Una perforacion es un problema serio y en muchos casos requieren cirugias para cerrar la perforacion.

Si tiene dolor severo, sangramiento o algun problema despues del examen, favor de ponerse en contacto con el doctor inmediatamente al (239)275-8882.

COLONOSCOPIA-TRILYTE (Colyte,Golyte, Nulyte) NECESITA TRANSPORTE*

CINCO DIAS ANTES DEL EXAMEN:

1. Descontinuar cualquier anticoagulantes como Coumadin, Plavix, Naproxen. Deje de medicamentos anti-inflamatorios (excepto Celebrex está bien)
2. Descontinuar cualquier aspirina, ibuprofeno, Motrin, Advil, etc No hay problema en tomar Tylenol / Paracetamol para el dolor o el dolor.(Aspirina 81mg está bien si en la actualidad tiene enfermedad cardiaca o un derrame cerebral / ACV o mini-accidentes cerebrovasculares / TIA).
3. Descontinuar cualquier vitamina E, los medicamentos a base de hierbas, aceite de pescado, fibra o suplementos de hierro.
4. No coma maíz, nueces, semillas o alimentos que contienen las semillas (por ejemplo: sandía, calabaza, pepino, tomate, pan de centeno)

UN DIA ANTES DEL EXAMEN:

1. Si esta tomando Medicamentos para la presion o el Corazon, por favor tome su dosis normal hoy.
2. *Para diabeticos- tome solo 1/2 de su dosis hoy.*
3. Suspenda las bebidas alcoholicas hoy.
4. Tome **SOLAMENTE** liquidos claros hoy para el desayuno, almuerzo y comida, todo el dia. Liquidos claros permitidos: Agua, jugos de frutas claros, Sodas claras, caldo de pollo, gelatina o paletas. Tambien puede tomar café o te. **Asegurece no tomar leche ni productos de leche. No coma alimentos solidos. No tome nada color rojo, violeta o verde.**
5. Prepare Trilyte o (Colyte, Golyte, Nulyte)
Añadir el agua del grifo a la línea de llenado. Reemplace la tapa firmemente y mezclar o agitar bien hasta que los ingredientes se hayan disuelto. No hay otros ingredientes que, debe añadirse a la solución.
Refrigere la solución Trilyte o (Colyte, Golyte, Nulyte) hasta que esté listo para beber. Escalofriante mejora la palatabilidad (tienda de no más de 48 horas)
6. Comience a beber la solución entre las 4 pm y 6 pm. Beba de 8-oz. vaso cada 10 minutos. Es mejor beber el vaso entero rápidamente, en lugar de que bebiendo pequeñas cantidades. Seguir bebiendo la solución hasta que la botella está vacía. Los movimientos de intestino debe comenzar aproximadamente 1 hora después de la primera copa y continuará periódicamente durante varias horas después de haber terminado de beber la última copa. En ese momento el movimiento del intestino debe ser líquido claro.
7. ****De lo contrario no coma, beba, ni mastique nada despues de la medianoche****

DIA DEL EXAMEN

1. *******NECESITA TRANSPORTE*******
2. Si toma medicamento para la presion o el Corazon, tome su dosis normal en cuanto se levante por la mañana con un trago de agua.
3. Diabeticos- No tome el medicamento para la diabetis. Traigala con usted.
4. Llegue para el examen a la hora escrita abajo. Solamente si su procedimiento es despues de la 1:00pm puede tomar 8 oz de liquidos claros **no mas tarde de las 7:30am. **De lo contrario no coma, beba, ni mastique nada despues de la medianoche****

SU PROCEDIMIENTO SERA:

FECHA: _____ HORA: _____ LLEGAR: _____
LUGAR: Barkley Surgicenter 63 Barkley Cir Suite 104 Ft Myers, FL 33907

LUEGO REGRESE:

FECHA: _____ HORA: _____ CON: _____

At the Ft. Myers office 4790 Barkley Cir Bldg. A At the Cape Coral office 1425 Viscaya Pkwy #101
Si tiene preguntas acerca del procedimiento, llame nuestra oficina al 239-275-8882, 239-458-0822 o visite nuestro website a www.giaswfl.com